



Australian Government



Información sobre la vacuna COVID-19 Pfizer (Comirnaty)

Acerca de la vacuna

Comirnaty (Pfizer Australia Pty Ltd) es una vacuna que puede evitar que las personas se enfermen por COVID-19. Comirnaty no contiene ningún virus vivo, y no puede contagiarle el COVID-19. Contiene el código genético de una parte importante del virus SARS-CoV-2 llamada proteína espiga. Después de recibir la vacuna, su cuerpo hace copias de la proteína espiga. Su sistema inmunitario aprenderá a reconocer y luchar contra el virus SARS-CoV-2, que causa el COVID-19. El código genético es rápidamente descompuesto por el cuerpo.

Para prevenir el COVID-19, todas las personas mayores de 16 años deberían vacunarse, con algunas excepciones especificadas en esta hoja informativa. La vacunación es voluntaria.

Puede discutir cualquier inquietud o pregunta que tenga acerca de la vacunación contra el COVID-19 con su proveedor de inmunización y/o su médico de cabecera antes de recibir la vacuna.

Beneficios de la vacuna

Un ensayo clínico muy grande demostró que Comirnaty es eficaz en la prevención del COVID-19 en personas de 16 años en adelante. Las personas que recibieron dos dosis de Comirnaty tenían aproximadamente un 95% menos probabilidades de contagiarse el COVID-19 que las personas que no recibieron la vacuna. Fue igualmente eficaz en personas mayores de 65 años, y en personas con algunas condiciones médicas preexistentes estables.

La protección contra el COVID-19 comienza alrededor de 2 a 3 semanas después de la primera dosis. Si bien una dosis puede dar cierta protección, puede durar solo a corto plazo. Dos dosis darán una protección óptima. Dado que ninguna vacuna es 100% efectiva, es posible que pueda enfermarse de COVID-19 aún después de la vacunación. No sabemos cuánto durará la protección de Comirnaty. Sabremos más al respecto con el paso del tiempo.

Actualmente no sabemos cuán eficaces son las vacunas contra el COVID-19 para prevenir la propagación del virus. Esto significa que el SARS-CoV-2 aún podría infectar a una persona vacunada. Incluso si no tienen síntomas o sólo síntomas leves, podrían transmitir esta enfermedad a otros.

Es por eso que es importante continuar con otras medidas preventivas como:

- distanciamiento físico
- lavado de manos
- uso de mascarilla
- pruebas de COVID-19 y cuarentena o aislamiento según lo requiera su estado/territorio.

Aunque haya sido vacunado con dos dosis de Comirnaty, debería hacerse una prueba de COVID-19 si tiene síntomas que cumplen los criterios de prueba de acuerdo con su autoridad sanitaria local (p. ej.: fiebre, tos, dolor de garganta).

A quiénes se les puede aplicar esta vacuna

Las personas mayores de 16 años pueden recibir esta vacuna contra el COVID-19.

A ciertos grupos de personas se les da prioridad para recibir vacunas en primer lugar porque tienen un mayor riesgo de:

- exposición al virus del COVID-19, por ejemplo, trabajadores en centros fronterizos o de cuarentena, centros de atención de la salud o centros de asistencia a la tercera edad, o
- enfermedad grave y muerte por COVID-19, por ejemplo, son de edad avanzada o tienen una condición médica subyacente.

A quiénes no se les debería aplicar esta vacuna

No deberían recibir esta vacuna quienes tuvieron:

- anafilaxia (un tipo de reacción alérgica grave) a una dosis previa de la misma vacuna contra el COVID-19, o
- anafilaxia después de la exposición a cualquier componente de una vacuna contra el COVID-19.

Precauciones para la vacunación

Las personas con ciertas condiciones pueden necesitar precauciones adicionales como quedarse bajo observación por 30 minutos luego de recibir su vacuna o consultar a un especialista en alergias. Indíquelo a su proveedor de inmunización si: ha tenido

- una **reacción alérgica a una dosis previa** de la vacuna contra el COVID-19, o a un ingrediente de la vacuna
- **anafilaxia en respuesta a otras vacunas o medicamentos.** Su proveedor puede verificar que no haya ingredientes en común con la vacuna contra el COVID-19 que va a recibir
- un **trastorno de mastocitos.**

Si **usted tiene un trastorno hemorrágico o está tomando un medicamento para adelgazar la sangre** (anticoagulante), infórmelo a su proveedor de inmunización. Su proveedor de inmunización puede ayudarlo a determinar si para usted es seguro recibir una inyección intramuscular y a decidir cuál es el mejor momento para la inyección.

Circunstancias especiales que deben analizarse antes de la vacunación

Personas con sistemas inmunitarios debilitados (inmunodeprimidos)

Las personas con el sistema inmunitario deprimido incluyen a quienes tienen una condición médica que debilita su sistema inmunológico. También pueden incluir a quienes pueden estar tomando medicamentos que suprimen su sistema inmunológico.

El gobierno australiano recomienda encarecidamente que las personas inmunodeprimidas reciban la vacuna contra el COVID-19. Comirnaty no es una vacuna viva. Es segura para personas inmunodeprimidas.

Las personas inmunodeprimidas, incluidas quienes viven con el VIH, tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades graves por el COVID-19, incluido un mayor riesgo de muerte.

Los ensayos clínicos de Comirnaty no incluyeron personas inmunodeprimidas, excepto en el caso de un pequeño grupo de personas con VIH estable. No sabemos si Comirnaty es tan eficaz en personas inmunodeprimidas en comparación con el resto de la población. Es posible que Comirnaty no sea tan eficaz en personas inmunodeprimidas como lo es en la población general. Es importante continuar con otras medidas preventivas como el distanciamiento físico después de la vacunación.

Mujeres embarazadas o amamantando

Si está amamantando, puede recibir Comirnaty. No necesita dejar de amamantar después de la vacunación.

De rutina, no se recomienda que las mujeres embarazadas reciban Comirnaty, pero pueden considerar vacunarse:

- si tienen mayor riesgo de contraer el COVID-19, por ejemplo, debido a su ocupación, o
- si tienen factores de riesgo para enfermedades graves, por ejemplo, debido a condiciones médicas preexistentes.

Si está embarazada, su proveedor de atención médica puede ayudarla a evaluar los beneficios y riesgos de la vacunación.

Personas con historial de COVID-19

Si tuvo COVID-19, informe a su proveedor de inmunización. Es posible que su proveedor le aconseje esperar hasta seis meses luego de su recuperación, antes de recibir una vacuna contra el COVID-19. Si aún está enfermo debido al COVID-19, hable con su doctor de cabecera para determinar el mejor momento para su vacunación.

Comirnaty y niños

Comirnaty sólo ha sido aprobada provisionalmente para su uso en personas de 16 años en adelante, y no se puede administrar a personas más jóvenes. Actualmente, ensayos clínicos están probando Comirnaty en niños mayores, pero aún no tenemos los resultados de dichos estudios. El riesgo de COVID-19, especialmente de enfermedad grave, en niños es menor que en adolescentes mayores y adultos.

Garantizar la seguridad de Comirnaty

Comirnaty y otras vacunas contra el COVID-19 han sido desarrolladas rápidamente debido al aumento en fondos de investigación de vacunas, y el acceso a números muy grandes de voluntarios para los estudios de investigación. Un amplio estudio clínico en el que participaron unas 44.000 personas confirmó que Comirnaty era segura y eficaz.

La Administración de Artículos Terapéuticos (TGA) evalúa todas las vacunas en Australia. Esto garantiza que para que una vacuna sea aprobada debe ser segura, eficaz y fabricada con un estándar de calidad muy alto. Una descripción del proceso de aprobación de las vacunas contra el COVID-19 está disponible en el [sitio web de la TGA](#).

La seguridad de las vacunas contra el COVID-19 se supervisará continuamente durante el programa de vacunación contra el COVID-19.

Hay informes de un efecto secundario muy raro que consiste en la formación de coágulos de sangre con bajo recuento de plaquetas en sangre después de la aplicación de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19. La vacuna de Astrazeneca contra el COVID-19 se fabrica de manera diferente. No hay evidencia de que esta afección esté vinculada a la vacuna de Comirnaty contra el COVID-19.

Usted puede informar todo efecto secundario sospechado a su proveedor de vacunación o a otro profesional de atención de la salud. Luego, ellos prepararán un informe formal en su nombre para el departamento de salud de su estado o territorio o directamente para la Administración de Artículos Terapéuticos (TGA).

Si prefiere informarlo usted mismo, visite el [sitio web de la TGA](#) para obtener información sobre cómo informar sospechas de efectos secundarios asociados con vacunas contra el COVID-19.